## 線形代数学 II やってみよう問題 NO.3

出席番号、名前:

問題 3.1. ある計量ベクトル空間 V のベクトル  $(V_1, V_2, V_3)$  が、

$$(\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j)_{ij} = A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ -4 & 11 & -9 \\ 6 & -9 & 25 \end{pmatrix}$$

を満たしているとする。

- (1)  $a_1 \mathbb{V}_1 + a_2 \mathbb{V}_2 + a_3 \mathbb{V}_3$  と  $b_1 \mathbb{V}_1 + b_2 \mathbb{V}_2 + b_3 \mathbb{V}_3$  の内積を A を用いて書け。[復習]
- (2)  $\mathbb{U}_2 = s\mathbb{V}_1 + \mathbb{V}_2$  が  $\mathbb{V}_1$  と直交するような実数 s を求めなさい。 [復習:s=2]
- (3)  $u_3 = tv_1 + uv_2 + v_3$  が  $v_1, v_2$  と直交するような実数 t, u を求めなさい。[-5,-1]
- (4)  $^tQAQ$  が対角行列であるような  $Q=\begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  を求めなさい。
- (5) V が 3 次元のとき、シュミットの直交化法を用いて V の正規直交基底を求めるには、あとどうすればよいか、手短に説明せよ。(計算はしなくてよい。)

問題 3.0.1. 一行感想を述べてください。

答:

一行感想以外の答えは下の線より下にかくこと。多い場合は裏にまわっても良い。