

今日のテーマ 《準同型とその核と像》

**定義 6.1.**  $R, S$  はともに (可換とは限らない) 環であるとし、 $f: R \rightarrow S$  をその間の写像とする。このとき、 $f$  が  $R$  から  $S$  への (環) 準同型写像であるとは、次の条件が成り立つときにいう。

- (1)  $f$  は  $(R, +)$  から  $(S, +)$  への群としての準同型である。すなわち、

$$f(a + b) = f(a) + f(b)$$

が、すべての  $R$  の元  $a, b$  について成り立つ。

- (2)  $f$  は  $R$  の積を  $S$  の積にうつす。すなわち、

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

が、すべての  $R$  の元  $a, b$  について成り立つ。

- (3)  $f$  は  $(R$  の) 単位元を  $(S$  の) 単位元にうつす。すなわち、

$$f(1_R) = 1_S$$

が成り立つ。

**定義 6.2.** 環のあいだの全単射準同型のことを、(環としての) 同型とよぶ。容易にわかるように、環のあいだの同型  $f: R \rightarrow S$  が与えられたとき、 $f$  の逆写像  $f^{-1}$  は  $S$  から  $R$  への同型になる。

群 (加法群) についての準同型の知識を使うと、次のことは直ちにわかる。

**補題 6.3.** 環準同型  $f: R \rightarrow S$  について、

- (1)  $f(0_R) = f(0_S)$  が成り立つ。  
 (2)  $f(-a) = -f(a)$  が全ての  $a \in R$  に対して成り立つ。

**定義 6.4.** 環準同型  $f: R \rightarrow S$  について、 $f^{-1}(0) (= \{r \in R; f(r) = 0\})$  のことを、 $f$  の核 (Kernel) と呼び、 $\text{Ker}(f)$  で書き表す。

$f$  の像 (Image) とは、通常通り、

$$\text{Image}(f) = \{f(r); r \in R\}$$

のことである。

**補題 6.5.** 任意の環準同型  $f: R \rightarrow S$  にたいして、

- (1)  $\text{Ker}(f)$  は  $R$  のイデアルである。  
 (2)  $\text{Image}(f)$  は  $S$  の部分環である。

環  $R$  上の一変数多項式環  $R[X]$  とは、 $R$  の元と、一つの変数  $X$  とで生成される環であった。同様に  $R[X_1, X_2, \dots, X_n]$  を定義することができる。その出自から当然、次の補題が成り立つ

**補題 6.6.** 任意の環  $R$  について、 $R[X][Y] \cong R[X, Y]$  という自然な同型が存在する。もっと一般に  $R[X_1, X_2, \dots, X_n] \cong R[X_1, X_2, \dots, X_{n-1}][X_n]$  がなりたつ。

**命題 6.7** (代入原理). 環  $S$  とその部分環  $R$  が与えられているとする。このとき、任意の  $S$  の元の  $n$  個の組  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$  にたいして、次のような環準同型  $\psi_s[X_1, X_2, \dots, X_n] \rightarrow S$  が唯一つ存在する。

- (1)  $\psi(r) = r \quad (\forall r \in R)$ ,  
 (2)  $\psi(X_j) = s_j \quad (j = 1, 2, 3, \dots, n)$ .

さらに、 $\psi$  は次のような形で与えられる。

$$\psi(p) = p(s_1, s_2, \dots, s_n)$$

例 6.8.  $\mathbb{R}[X]$  から  $\mathbb{C}$  への写像  $f$  を、

$$f(p) = p(\sqrt{-1})$$

で定めると、次のことが分かる。

- (1)  $f$  は写像としてうまく定義されている。
- (2)  $f$  は環の準同型である。
- (3)  $f$  の像は  $\mathbb{C}$  全体である。
- (4)  $f$  の核は  $(X^2 + 1)\mathbb{R}[X]$  である。