

統計数学IA 第7回

担当：三角 淳 2015年6月2日

講義概要 (教科書 p30–38 も参照)

- ・ベイズの公式の応用例。
- ・確率変数：偶然現象を観測して得られる数値。写像 $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ が、「任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}$ 」の条件をみたすときにいう。

補充問題

[1][中間試験の予告問題 (数値は変える予定です)] 3つの店のうちのどれか1つに行き、更にその店で品物を買う。1番目の店に行く事象を A_1 、2番目の店に行く事象を A_2 、3番目の店に行く事象を A_3 として、 $P(A_1) = \frac{2}{5}$, $P(A_2) = \frac{2}{5}$, $P(A_3) = \frac{1}{5}$ であるとする。店で買った品物が不良品である事象を B とし、それぞれの店に行ったときに、買った品物が不良品である条件付確率を $P(B|A_1) = \frac{1}{40}$, $P(B|A_2) = \frac{1}{30}$, $P(B|A_3) = \frac{1}{20}$ とする。このとき、もし買った品物が不良品であったとして、行った店が1番目の店である条件付確率 $P(A_1|B)$ を求めよ。

[2] 長さ10の棒をランダムに2分割する試行を考える。但し、分割の位置はどの点も同等に選ばれるとする。

- (1) 対応する標本空間 Ω を具体的に書け。
- (2) 長い方の断片の長さと短い方の断片の長さの差を X とする。このとき各 $\omega \in \Omega$ に対して $X(\omega)$ を求めよ。
- (3) $P(3 < X < 5) = P(\{\omega \in \Omega \mid 3 < X(\omega) < 5\})$ を求めよ。